



Avortements

MESURES SANITAIRES : HYGIÈNE ET BONNES PRATIQUES D'ELEVAGE

Prévention des avortements	Lors d'avortement
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas transporter la jument au cours du dernier mois de gestation et éviter les stress. • Garder les juments pleines par petits lots et maîtriser l'alimentation. • Fin de gestation : vérifier que la jument est correctement vermifugée. • Vacciner toutes les juments et chevaux du haras contre la rhinopneumonie. • Vérifier l'absence d'écoulements vulvaires ou montées de lait (placentite possible). • Isoler les juments nouvellement arrivées pendant 21 jours. 	<ul style="list-style-type: none"> • Isoler la jument et enfermer le placenta et le foetus dans un grand sac poubelle étanche, désinfecter bottes (javel diluée) et mains (solution hydro alcoolique) du personnel. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> APPEL IMMÉDIAT DU VÉTÉRINAIRE </div>

TRAITEMENT : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Identification de la maladie
<ul style="list-style-type: none"> • Avortement : foetus expulsé mort avant 320 jours ou mort-né lors de poulinage normal.

Stratégie de traitement
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'expulsion complète du placenta. • Si coliques discrètes (cf. fiche coliques) : une injection d'antalgique

Evaluation de l'efficacité du traitement
<ul style="list-style-type: none"> • Absence de tous symptômes généraux.

CRITÈRES D'ALERTE SANITAIRE - APPEL ET VISITE DU VÉTÉRINAIRE

- Tous les signes de maladies en fin de gestation (écoulements, fièvre, perte de lait, coliques, gonflement anormal de la mamelle, etc...)
- Après avortement : stratégie d'isolement et de recherche de la cause de l'avortement.