

Diarrhées du cheval adulte

MESURES SANITAIRES : HYGIÈNE ET BONNES PRATIQUES D'ELEVAGE

Prévention des diarrhées	En cas de diarrhées
<ul style="list-style-type: none"> • Eviter les aliments contaminés par des moisissures grâce à un bon stockage. • Contrôler la qualité de l'eau d'abreuvement. • Eviter les changements alimentaires brutaux (faire une transition sur plusieurs jours). • Maintenir un apport de fibres alimentaires. • Vermifuger suivant les conseils du vétérinaire pour lutter efficacement contre l'ensemble des parasitoses intestinales tout en limitant la sélection de résistances aux vermifuges. • Eviter les situations de stress aigu. • Entretien dentaire régulier (c'est une des premières causes de diarrhée après le parasitisme). 	<ul style="list-style-type: none"> • Estimer l'intensité de la diarrhée : de ramollissement des crottins à diarrhée profuse. • Isolation du sujet diarrhéique avec mesures de désinfection à la sortie du box : pédiluve et nettoyage des mains. • Prise de la température. • Examen de la couleur et de la sécheresse des muqueuses gingivales. • Arrêter les aliments concentrés, laisser de l'eau à disposition.

TRAITEMENT : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Identification de la maladie		
<ul style="list-style-type: none"> • Ramollissement des crottins avec plus ou moins d'intensité, crottins non moulés, bouseux ou liquidiens. • Cheval calme ou coliquant : signes de colique modérés avec traces de fèces sur l'arrière main et queue souillée. 		
Stratégie de traitement		
Ramollissement des crottins sans fièvre ni coliques	Diarrhées liquidiennes	Ramollissement des crottins avec fièvre et/ou coliques et/ou abattement
<ul style="list-style-type: none"> • Apport de probiotique. • Contrôle de la qualité et quantité des aliments, diminution de la durée de pâturage en période de pousse intense, diminution du concentré. • Administration buccale de pansement intestinal: Smectite = _____ ou/et charbon végétal inactivé = _____ 	<div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;">APPEL IMMÉDIAT DU VÉTÉRINAIRE</div>	
Evaluation de l'efficacité du traitement		
<ul style="list-style-type: none"> • Amélioration de la consistance des crottins dans les 24 heures sinon appeler le vétérinaire. • Maintien des probiotiques et pansements intestinaux pendant 3 à 5 jours. 		

CRITÈRES D'ALERTE SANITAIRE - APPEL ET VISITE DU VÉTÉRINAIRE

- Diarrhée profuse, liquidiennes
- Hyperthermie
- Déshydratation
- Abattement ou coliques
- Muqueuse gingivale congestionnée rouge ou violette
- Diarrhée persistante ou récidivante