



# Diarrhées du poulain

## MESURES SANITAIRES : HYGIÈNE ET BONNES PRATIQUES D'ELEVAGE

Facteurs favorisants	Contagiosité
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Défaut d'immunité passive (mauvaise prise colostrale ou mauvaise qualité du colostrum).</li> <li>• Mauvaise hygiène des locaux, paddocks, pâtures (surpâturage).</li> <li>• Traitements antibiotiques non contrôlés.</li> <li>• Programme de vermifugation de la poulinière absent ou inadéquat.</li> <li>• Alimentation inadaptée du poulain orphelin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isoler tout poulain malade et sa mère du reste du lot.</li> <li>• Nourrir le poulain malade et sa mère en dernier (après les sujets sains).</li> <li>• Utiliser blouses, sur-bottes, pédiluves d'eau de javel diluée pour le personnel soignant et solutions hydro-alcooliques pour les mains.</li> <li>• Nettoyage puis désinfection des locaux contaminés.</li> </ul>

## TRAITEMENT : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Stratégie de traitement
<p>Si le poulain est âgé de <b>plus de 7 jours</b> avec  <b>diarrhée peu profuse + appétit conservé + bon état général + température rectale &lt; 38.9° C</b></p> <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En première intention</b> : administration de probiotiques.....et/ou protecteurs de la muqueuse gastro-intestinale ..... et/ou charbon actif .....</li> <li>• <b>En seconde intention</b> : administration d'un anti-diarrhéique par voie orale..... et d'un antalgique par voie intramusculaire ou intraveineuse .....</li> </ul>

## CRITÈRES D'ALERTE SANITAIRE - APPEL ET VISITE DU VÉTÉRINAIRE

- Poulain est âgé < 7 jours : suspicion de septicémie pré ou néonatale.
- Si déshydratation (pli de peau persistant, œil creux), abattement, température rectale > 39° C, distension abdominale, disparition de l'appétit ou coliques.
- Caractère épidémique (au moins deux poulains d'un lot avec les mêmes signes).