

Non délivrance

MESURES SANITAIRES : HYGIÈNE ET BONNES PRATIQUES D'ÉLEVAGE

Prévention de la Non délivrance	Lors de Non délivrance immédiate
<ul style="list-style-type: none"> • Éviter les manœuvres inadaptées lors du poulinage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Marcher la jument si elle est agitée. • Suspendre un poids de 1 kg environ au placenta.

TRAITEMENT : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Identification de la maladie
<ul style="list-style-type: none"> • Absence d'expulsion complète du placenta (extrémité des 2 deux cornes) 3 à 4 heures après le poulinage. • Placenta déchiré ou doute sur l'expulsion d'un placenta complet. • Sang abondant ou écoulements suspects.

Stratégie de traitement	
<p>Si jument normale mais délivrance incomplète ou tardive (> 3/4 heures). ↓</p> <p>Injection de 10 UI docytocine _____ = 1 ml par voie intramusculaire toutes les heures (3 fois de suite 2ml pour la jument de trait).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si délivrance incomplète ou tardive et autre signe tel que fièvre, tremblements, coliques, raideur, chaleur des pieds et sudation. <p style="text-align: center;">APPEL IMMÉDIAT DU VÉTÉRINAIRE</p>

Evaluation de l'efficacité du traitement
<ul style="list-style-type: none"> • Expulsion complète du placenta avant la sixième heure : extrémités intactes des deux cornes.

CRITÈRES D'ALERTE SANITAIRE - APPEL ET VISITE DU VÉTÉRINAIRE

- Fièvre, tremblements, coliques, sudation, raideur, chaleur des pieds, perte d'appétit : appel du vétérinaire dès l'apparition de tout symptôme.
- Non délivrance 6 heures après le poulinage malgré traitement mis en place.
- Placenta d'aspect anormal (poids > 6 kg, couleur suspecte, incomplet).