

Plaies

MESURES SANITAIRES : HYGIÈNE ET BONNES PRATIQUES D'ELEVAGE

Prévention des plaies et de leurs complications	En cas de plaie
<ul style="list-style-type: none"> • Clôtures et équipements adaptés spécifiquement aux équidés. • Protections lors du travail. • Vaccination antitétanique à jour de tout l'effectif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêter l'exercice. • Evaluer visuellement la localisation exacte de la plaie, sa profondeur, l'importance du saignement, s'il y a boiterie, ou fièvre. • En l'absence de boiterie ou d'hémorragie importantes, ramener le cheval dans un endroit sec, propre, à proximité d'un point d'eau potable et d'électricité.

TRAITEMENT : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Identification de la maladie	
<ul style="list-style-type: none"> • Toute rupture de la barrière cutanée (coupure, piqûre, écrasement, brûlure). • Peuvent être associés : saignement, écoulement de synovie, boiterie, oedème. 	
Stratégie de traitement	
Plaies « simples »	Plaies « complexes »
<ul style="list-style-type: none"> • Plaie strictement cutanée (coupure ou éraflure). • Taille < 5 cm. • Non située près de l'œil, d'une articulation, d'un tendon, du thorax ou de l'abdomen. • Pas de boiterie, de saignement important, d'écoulement de synovie ou de fièvre. • <u>Cheval en bon état général</u> : <ul style="list-style-type: none"> • Tondre les poils de la région si nécessaire, nettoyer largement la plaie puis désinfecter (douche, POVIDONE IODÉE), quotidiennement. • Appliquer ensuite une crème cicatrisanteet/ou un spray antiseptique et/ou antibiotique..... • Appliquer un pansement humide : 50 ml de solution iodée dans un litre d'eau tiède propre, mouiller un coton type sous bande, et le maintenir en place avec une bande. • Vérifier la protection antitétanique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plus profonde que la peau seule • Située près de l'œil, d'une articulation, d'un tendon, du thorax ou de l'abdomen. • Saignement, boiterie, fièvre, cheval choqué • Plaie large, multiple, déchiquetée, présence de fistules • Brûlures • Présence d'un corps étranger toujours dans la plaie. • Plaie infectée ou suppurative <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>APPEL IMMÉDIAT DU VÉTÉRINAIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si hémorragie majeure : pansement compressif propre en attendant. • Vérifier protection antitétanique. </div>
Evaluation de l'efficacité du traitement	
<ul style="list-style-type: none"> • La peau cicatrise rapidement (quelques jours) et proprement. • Absence de fièvre, de boiterie, d'œdème important ou de suintement. 	

CRITÈRES D'ALERTE SANITAIRE - APPEL ET VISITE DU VÉTÉRINAIRE

- Hémorragie
- Toute plaie « complexe »
- Plaie qui ne cicatrise pas rapidement ou qui bourgeonne.
- Apparition de fièvre, boiterie, œdème, suintement ou suppuration, atteinte de l'état général du cheval.